

## NOTA TÉCNICA N° 004/2016

*Ementa: Orientação para solicitação de sorologia para Hepatites Virais ao Lacen/PR*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam amostras para o Lacen/PR, para sorologia das Hepatites Virais e tendo em vista o seu papel como laboratório de referência em saúde pública, informamos os procedimentos:

### **Para Hepatite A**

Encaminhar somente os casos suspeitos de infecção aguda pelo vírus da Hepatite A para a pesquisa do anticorpo IgM contra o vírus da Hepatite A (HAV).

Solicitar no GAL: Hepatite A - Lacen

**Observação:** O Lacen/PR não realiza anti-HAV IgG e anti-HAV total.

### **Para Hepatite B**

- HBsAg – testar este marcador através de Testes Rápidos – TR na Unidade de Atendimento ou através de sorologia em laboratórios locais, para a triagem da infecção pelos vírus da Hepatite B (HBV);

**Encaminhar somente os casos com HBsAg reagente, para confirmação no Lacen/PR.**

Solicitar no GAL: Hepatite B - Lacen

Na solicitação para Pesquisa de Hepatite B, no GAL, constam 6 marcadores. No entanto, serão realizados conforme avaliação do conjunto de resultados obtidos e informações clínicas cadastradas do paciente.

- HBsAg e Anti HBc Total – serão realizados pelo Lacen/PR, prioritariamente;

- Anti-HBs – será realizado somente para acompanhamento de cura do paciente, a critério do Lacen/PR;

- Anti HBc-IgM – será realizado para definição de estado agudo a critério do Lacen/PR;

**LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ**  
UNIDADE GUATUPÉ

- HBeAg e Anti HBe - serão realizados somente para acompanhamento de paciente crônico (paciente com HBsAg reagente há mais de 6 meses ou outros sinais clínicos). Informar devidamente no campo "Observações" do GAL.

**Importante:** O Lacen/PR não realiza pesquisa de Anti-HBs para avaliação de vacina de Hepatite B.

### **Para Hepatite C**

- Anti-HCV – testar através de Testes Rápidos – TR, na Unidade de Atendimento ou através de sorologia em laboratórios locais, para a triagem da infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV).

**Encaminhar somente os casos reagentes, para confirmação no Lacen/PR.**

Solicitar no GAL: Hepatite C – Lacen

**Importante:** Somente depois de confirmado o anti-HCV pelo Lacen/PR, deverá ser encaminhada amostra para Carga Viral de Hepatite C, sendo:

- 01 amostra de plasma recém coletada, encaminhada no próprio Tubo Preparador de Plasma – Tubo PPT (tampa pérola), fornecido pelo Lacen/PR.

Solicitar no GAL: Hepatite C Quantitativo – Biologia Molecular

Informar os resultados obtidos anteriormente no campo "Observações" da requisição do GAL ou impressos.

### **Para Hepatite D**

Investigar Hepatite Delta somente em indivíduo que apresentar o HBsAg Reagente (vírus da Hepatite B) e que resida ou esteve em áreas endêmicas para este agravo.

Solicitar no GAL: Hepatite D

### **Para Hepatite E**

Investigar Hepatite E somente após excluir Hepatites A, B e C, além dos vírus Epstein-Barr (EBV) e Citomegalovírus (CMV).

Informar os resultados obtidos anteriormente como excludentes, no campo "Observações" da requisição do GAL ou impressos.

Solicitar no GAL: Hepatite E

**LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ**  
UNIDADE GUATUPÉ

Consultar, também:

Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR – Revisão 02, 2016.

Disponível em: <http://www.lacen.saude.pr.gov.br>

Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais – MS, 2015. Disponível em:

[http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58551/manual\\_tecnico\\_hv\\_pdf\\_75405.pdf](http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58551/manual_tecnico_hv_pdf_75405.pdf)

São José dos Pinhais, 31 de outubro de 2016.

Elizabeth El Hajjar Droppa

Chefe da Divisão dos Laboratórios de  
Epidemiologia e Controle de Doenças

Yatiyo Matsui Moriya

Farmacêutica Bioquímica da Seção de  
Imunologia/Serviço de Hepatites